

Questi articoli contengono i risultati di ricerca dal National Center for Biotechnology Information ([NCBI](#)) presso la US National Library of Medicine ([NLM](#))

Piega diagonale del lobo dell'orecchio: possibile significato come fattore di rischio cardio-vascolare e sua relazione con l'agopuntura dell'orecchio.

[Romoli M](#)¹ , [Tordini G](#) , [Giommi A](#) .

[Informazioni sull'autore](#)

Astratto

La piega diagonale del lobo dell'orecchio, rilevabile soprattutto dopo i 40 anni, è ancora accettata come un segnale di rischio di malattia coronarica. In letteratura alcuni autori riportano un'associazione tra ansia e malattia coronarica. Nel nostro lavoro un gruppo di 143 pazienti con piega del lobo dell'orecchio ha mostrato - in entrambi i sessi e in tutti i decenni esaminati (5 °, 6 °, 7 °) - livelli più elevati di ansia rispetto al gruppo di controllo. Il possibile significato della piega è stato considerato sulla base delle attuali conoscenze di agopuntura dell'orecchio e della mappatura somatotopica del SNC sul lobo dell'orecchio.

Agopuntura auricolare in medicina psicosomatica: l'importanza dell'area Sanjiao (tripla stufa).

[Romoli M](#)¹ , [Giommi A](#) .

[Informazioni sull'autore](#)

Astratto

Un gruppo di 50 pazienti con possibili disturbi psicosomatici del sistema cardiovascolare, respiratorio e digestivo sono stati trattati con l'agopuntura dell'orecchio. Insieme a un gruppo di controllo di 20 volontari senza sintomi hanno ricevuto 4 trattamenti settimanali e un controllo finale della terapia dopo 6 settimane. Tutti i soggetti sono stati esaminati con il test MMPI, la scala di Paykel per eventi stressanti della vita e con la scala SRT (Symptom Rating Test) per misurare ad ogni trattamento le variazioni di ansia, depressione e livelli di somatizzazione. I risultati mostrano una tendenza simile di risposta all'agopuntura in entrambi i gruppi, che era significativamente più pronunciato nel gruppo di stress per la riduzione del punteggio SRT e il numero di punti di agopuntura dell'orecchio. L'orecchio esterno è stato sensibilizzato dalla risposta allo stress in alcune aree ricorrenti, in particolare del cavum conchae.

Agopuntura auricolare e medicina psicosomatica: asimmetria destra-sinistra di agopunti e preferenze laterali - Parte II.

[Romoli M](#)¹, [Giommi A](#).

[Informazioni sull'autore](#)

Astratto

Un gruppo di 50 pazienti con possibili disturbi psicosomatici è stato esaminato con cinque test delle preferenze di destra-sinistra: Oldfield's Handedness Inventory e i test di preferenza di Coren e Porac per mano, piede, occhio e orecchio. I pazienti sono stati ordinati in "completo diritto" (risposte coerenti) e "diritto incompleto" (avendo risposto "a sinistra" ad almeno una domanda) gruppi per ciascuno di questi diversi test. La sensibilizzazione dell'orecchio sinistro, in particolare della zona di Sanjiao o Triple Heater, è più elevata nell'intera destra che nel gruppo di destra incompleto. Il lato da trattare con l'agopuntura è importante per la diagnosi e la terapia.